Fotografata l'onda azzurra della morte - Malattie cuore prima causa morte mondo - Salta


http://www.dimensionenotizia.com/modules/news/article.php?storyid=11492

<u>Fotografata l'onda azzurra della morte - Malattie cuore prima causa morte mondo - Saltare colazione fa male a cuore uomini - Sclerosi multipla, ok farmaco concentrato</u>
Salute e Benessere

Inviato da : Pino Cecere

Pubblicato il: 14/1/2024 8:40:00

Fotografata l'onda azzurra della morte. Ricerca, identificherà geni che controllano invecchiamento -- Malattie cuore prima causa morte mondo. Attacchi cardiaci e ictus responsabili 1/4 decessi -- Saltare colazione fa male a cuore uomini. Cattiva abitudine legata ad attacchi cardiaci piu' frequenti -- Sclerosi multipla,ok farmaco concentrato. Risultati studio Gala su glatiramer acetato, riduce ricadute -- 'Pronto soccorso' per guai sesso coppia. Nuovi dipartimenti nelle Asl, disagi per 16 milioni di italiani.



e malattie cardiovascolari rimangoro al primo posto tra le causse di morte nel mondo, con gli attacchi cardiaci e gli ictus insieme responsabili di quasi un quanto dei decessi. Lo afferma ("Oms, che ha annunciato che guider\"A una task force contro queste e le altre malatine non trasmissibili.	
classifica dell'agenzia Onu vede al primo posto l'achemia caridiaca, con 7,1 miliori di vittime l'anno, seguita da clus (6.2) e infezioni respiratorie (3.2) con le broncopneumopaté al quanto posto.	
	-
me cardiologico pir ^(A) elevato per gli comini che saltano di regglia lia cotazione del mattino. A mettere in guardia dia questo pericolo il 'uno studio Una dei ricercatori della Hannard School of Public Health secondo il quale non for colazione il 'una cattiva abbudine che accresca il rischio di malattire di cuore ed espone ad attacchi cardiaci fatali pi ^(A) brequenti della media. La ricerca ei condoste tra il 1902 e il 2008 su 27 000 individud di sesso maschille fina il de gli El zeni.	
as condotas fra il 1992 e il 2008 su 27 000 individui di sesso maschile fra i 45 e gli 82 anni.	

Fotografata l'onda azzurra della m nttp://www.dimensionenotizia.com/module			orte mond
		•	
s dose di glatiramer acetato pari a 40mg/1mL somministrata per via sottocutanea tre volte la settimana riduce significativamente l'incidenza di ricadute, nella vata glatiramer acetato e di 20mg/1mL, sotto torma di niscione sottocutanea quoridana.	Sclerosi Multipla Recidivante Remittente (Smrr), nell'arco di 12 mesi. Lo dimostrana	s i risultati dello studio Gala, pubblicati su Annals of Neurology. Attualmente - riferisce	Teva, la societa' produttrice del farmaco - la dose
вы развительного с об допутить, зооб отного в техного зообоснико уроковия.			
anno il prossimo auturno i 'Opartimenti della salute sessuale per la coppia', ambulatori in cui ginecologi e urologi insieme aiuteranno uomini e donne alle p	rese con problemi che possono arrivare anche a 'rompere' l'unione. L'iniziativa, la p	rima in Italia, e' stata presentata da SocietĂ Italiana di Urologia (Siu) e Associazione	Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi). I