

## **Pillola Anticoncezionale**

**Categoria : RUBRICA MEDICA**

**Publicato da [D.N.](#) in 12/10/2008**

**DOMANDA:** Ho un problema. Prendo regolarmente la pillola anticoncezionale ma questa settimana, coincidente con la terza della pillola, ho dovuto assumere amoxicillina(1g). Purtroppo,nonostante abbia cercato di fare attenzione,ho avuto un piccolo "incidente" con il mio ragazzo durante un rapporto. !

So che gli antibiotici possono alterare l'efficacia della pillola però in questi giorni non ho mai avuto perdite intermestruali. Inoltre solitamente la pillola mi causa forte tensione al seno che scompare durante il periodo di pausa ma durante l'assunzione dell'antibiotico la tensione non è diminuita. Questo potrebbe significare che la pillola non ha perso efficacia? Ed eventualmente a partire da quale giorno un test di gravidanza sarebbe attendibile? Posso farlo sin da ora? (domani è il mio ultimo giorno di pillola prima della pausa) Grazie mille per l'attenzione

**RISPOSTA:** Gli estrogeni vengono metabolizzati grazie all'azione degli enzimi della flora batterica intestinale, gli antibiotici distruggono la flora intestinale,alterando l'assorbimento degli estrogeni e quindi riducendo l'efficacia contraccettiva.

Concludendo, se la terapia è stata lunga, per sicurezza deve attendere la pausa dei 7 gg. Si rivolga al suo medico.