

## **Disfunzione erettile - La diagnosi prima di procedere con le cure.**

Categoria : RUBRICA MEDICA

Pubblicato da [Dott. Gianni Fusco](#) in 13/12/2008

Per diagnosticare le cause della disfunzione erettile si inizia con la cosiddetta **anamnesi**, ossia l'attenta raccolta della storia clinica e della **storia della vita sessuale** del soggetto. Essa contiene preziose informazioni che compongono oltre la metà del quadro che l'andrologo va ad indagare e pertanto necessita di un tempo di raccolta abbastanza lungo. Successivamente, altre importanti informazioni possono derivare dalla **visita medica andrologica** che esamina gli organi genitali.



A questo punto lo specialista potrà decidere se sono necessari accertamenti mirati, che variano da paziente a paziente, e possono comprendere l'utilizzo di questionari che consentono di ottenere informazioni ancor più estese e rilevanti.

Vi è poi la possibilità di **effettuare indagini del sangue** di routine, quali ad esempio glicemia e colesterolo, e dosaggi ormonali, in particolare del testosterone e della prolattina.

Vi sono poi **indagini strumentali per verificare la condizione anatomica** e funzionale degli apparati coinvolti nel fenomeno erettivo. Fra questi la rilevanza maggiore spetta allo studio del sistema vascolare del pene mediante **ecocolordoppler**. Questo esame consente di ottenere precise informazioni sullo stato delle arterie del pene e sulla loro capacità di avere un flusso arterioso dotato di caratteristiche valide per ottenere un'erezione.