


## **Le statine utilizzate per trattare alti livelli di colesterolo**

**Categoria : EPATOLOGIA**

**Publicato da [Dott.Vincenzo Di Costanzo](#) in 17/7/2008**

**Le statine utilizzate per trattare alti livelli di colesterolo potrebbero causare danni al fegato: uno studio statunitense. Una ricerca condotta negli States e pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology mostrerebbe i danni causati al fegato da un eccessivo uso di statine nel trattamento di alti livelli di colesterolo.**



La ricerca ha preso in esame i risultati di 23 ampi trials clinici che utilizzavano statine.

Secondo gli studiosi nordamericani, che hanno presentato i dati anche sulla versione on-line di Natural News, le statine ad alte dosi possono causare un danno epatico ben 2,4 volte rispetto al danno epatico causato da statine a basse dosi; in particolare, farmaci con simvastatina o con atorvastatina risultavano per il fegato rispettivamente 1,6 volte e 4 volte più pericolosi se somministrati in alte dosi rispetto a coloro che assumevano basse dosi.

Una gran parte dei danni epatici causati da statine sono di scarso impatto e reversibili, ma in alcuni pazienti i danni possono risultare molto gravi e potenzialmente letali.